


¿Cómo es vivir con epilepsia? Análisis preliminar de una escala sobre Percepción de Enfermedad en pacientes con epilepsia

Sarudiansky, M; Ponieman, M; Stivala, E; Wolfzun, C; Giagante, B; Oddo, S; Kochen, S; D'Alessio, L.

Introducción

Presentar los resultados preliminares de la adaptación lingüística y conceptual del Cuestionario Breve de Percepción de Enfermedad (B-IPQ, Broadbent, 2006) en pacientes con epilepsia. Éste es un instrumento autoadministrable de 9 ítems que evalúa aspectos cognitivos y emocionales sobre la experiencia de enfermedad.




Métodos

Se siguieron los pasos para la adaptación transcultural de técnicas de evaluación psicológica: traducción, validez de contenido mediante jueces expertos, feedback de pacientes y prueba piloto (ITC, 2017).


46 pacientes del Centro de Epilepsia del Hospital Ramos Mejía (CABA) y del Hospital El Cruce (Florencio Varela) participaron en la prueba piloto. Todos firmaron consentimiento informado.

Equivalencia lingüística	Equivalencia conceptual	Prueba piloto
--------------------------	-------------------------	---------------



Resultados

Datos sociodemográficos de los participantes




Resultados preliminares – Prueba piloto

CORRELACIONES DIMENSIONES B-IPQ-TOTAL

Consec.	Duración	Identidad	Preocupación	Respuesta emocional	Control personal	Control tratamiento	Comprensión	Puntaje total BIPQ
Consecuencias	1	0,126	,626**	,566**	,654**	,482**	0,024	0,146
Duración		1	-0,117	0,093	0,153	-0,02	-0,104	0,132
Identidad			1	,527**	,412**	0,209	0,006	,660**
Preocupación				1	,732**	0,282	0,054	0,196
Respuesta emocional					1	,500**	0,166	0,135
Control personal						1	0,086	0,26
Control tratamiento							1	-0,129
Comprensión								1
Puntaje total BIPQ								

DIMENSIONES B-IPQ SEGÚN ESTUDIO (COMPARACIÓN MEDIAS)



Conclusiones

Los resultados obtenidos en la prueba piloto son similares a los de pacientes con epilepsia realizados en otros contextos.

La versión argentina del B-IPQ es una herramienta potencialmente válida y útil para evaluar aspectos relacionados con la experiencia de enfermedad de los pacientes