

### Impacto de la vacunación contra el COVID-19 en la enfermería del turno SADOFE 1 del Hospital El Cruce de diciembre del 2020 a mayo del 2021.

Autoras: Lic. Beatriz Llanos, Lic. Celeste López , Lic. Graciela Fretes.

#### Resumen

El presente es un estudio realizado en el Hospital El Cruce pretende describir el impacto de la vacunación en los enfermeros del turno SADOFE 1, de las áreas críticas como las intermedias, determinando el porcentaje de los que tuvieron COVID-19 en la primera etapa de pandemia donde para prevenir el contagio sólo se contaba con la colocación del equipo de protección personal, y en una segunda etapa donde ya había vacunas. Además, determinar el porcentaje de vacunados, qué vacunas recibieron, el porcentaje de enfermeros con COVID luego de la inmunización, si tuvieron síntomas y si requirieron internación y finalmente, las razones por las que decidieron vacunarse y que piensan sobre la obligatoriedad de la vacunación para el personal de salud.

#### Objetivo principal:

Describir el impacto de la vacunación contra el COVID-19, en la enfermería del turno SADOFE 1 del Hospital El Cruce, en cuanto a la incidencia de contagios de la enfermedad.

#### Métodos:

Tipo de estudio: Cuantitativo, descriptivo.

Muestra: Enfermeros del SADOFE 1 del Hospital El Cruce.

Instrumento de recolección de datos: Encuesta a los Enfermeros.

#### Resultados:

El 71,4% tuvo COVID-19 antes de ser vacunado y el 28,6 no tuvo la enfermedad.


El 100% decidió ser inmunizado.

El 97,1% recibió la vacuna Sputnik V y el 2,9% la vacuna de AstraZeneca.

El 20% de los vacunados cursó la enfermedad luego de recibir la primera dosis y el 30% luego de la segunda dosis.


De los que cursaron la enfermedad luego de ser vacunados, el 80% con sintomatología y sólo el 9,1% requirió internación en algún centro de salud.

Que vacuna recibió?  
35 respuestas



El 97,1% de los enfermeros recibieron la vacuna Sputnik V y el 2,9% recibió AstraZeneca.

Requirió internación en algún centro de salud?  
11 respuestas



El 90,9% no requirió internación al cursar COVID-19 luego de ser vacunado.

#### Conclusión:

En la primera etapa de la pandemia, cuando aún no había vacunas contra el COVID-19, un alto porcentaje de enfermeros habían cursado la enfermedad (71,4%) y luego, en la segunda etapa, con las vacunas disponibles y con una alta adhesión a la vacunación, aunque hubo nuevamente enfermeros contagiados, se produjo un notable descenso en el porcentaje (50%) y cabe destacar que el 80% refirió haber tenido síntomas leves por lo que no requirieron hospitalización.

La mayoría de los enfermeros se habían inmunizado con la vacuna Sputnik V y un grupo menor con la vacuna del laboratorio AstraZeneca.

De esta forma se pudo determinar impacto positivo de la vacunación contra el COVID-19, en el turno SADOFE 1, en cuanto a la incidencia de contagios de la enfermedad y lo que es mucho más importante aún: la preservación de la vida de los enfermeros.

