

HERNIA DIAFRAGMATICA POSTTRAUMATICA

DR GANDOLFO SEBASTIAN, DR JAUREGUI FRANCISCO, DR BODEGA GUSTAVO, DR FERNANDEZ AUGUSTO, DR CARRAFIELLO FERNANDO, DR MAYOR FEDERICO, DR RUSSO OSVALDO

Introducción


Las hernias diafragmáticas de origen traumático son una patología poco frecuente y generalmente está asociada a lesiones en otros órganos. Se presenta este caso por la forma de evolución, siendo importante el seguimiento de la paciente para un diagnóstico temprano.

Métodos

Se describe el caso clínico de paciente de sexo femenino que ingresa por SAPC por presentar dolor abdominal epigástrico y vómitos de 48 hrs de evolución. Con antecedente tardío de politraumatismo grave con fractura de pelvis y lesión vesical asociada, requiriendo resolución quirúrgica e internación prolongada en HEC.

Resultados

Paciente ingresa por servicio de SAPC, se realiza anamnesis y estudios complementarios, realizado el diagnóstico de hernia diafragmatica izquierda post-traumatica se decide intervención quirúrgica para su resolución. Se realiza abordaje mediante toracotomía y colocación de malla para corrección del defecto diafragmático, presenta buena evolución postoperatorio, continúa seguimiento ambulatorio



Conclusiones

Las hernias diafragmáticas postraumáticas son tardías cuando los síntomas aparecen después de 14 días. El hemidiafragma izquierdo es el más afectado. El contenido herniario más común es estómago, bazo, epiplón y colon transverso. El diagnóstico es muy difícil por la existencia de otras lesiones asociadas o sobre todo en aquellos casos donde los signos y síntomas se presentan tardíamente.